

¿Eres nuevo aquí? Regístrate | Iniciar sesión | Ayuda Actualiza a IE8 más seguro Correo | Mi Y! | Yahoo

YAHOO! FINANZAS ESPAÑA

EN CINES 2D, 3D E IMAX 05.07.13 HAZ CLICK PARA EXPANDIR DEO BLOGS FOTOS

SECCIONES TODAS LAS NOTICIAS TEMAS BOLSA DIVISAS EMPRESAS RESULTADOS ANALISIS BURSÁTIL EN VÍDEO RSS INDEX

Introducir símbolo Ver cotizaciones mié, 17 Jul 2013, 11:54 CEST - Mercados españoles cerrados en 5 hrs 36 min

Hasta el 40% de los españoles puede sufrir intolerancia a la lactosa

Los síntomas son muy inespecíficos

europa press

Europa Press - Hace 40 minutos

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Hasta un 40 por ciento de los españoles puede sufrir intolerancia a la lactosa, según ha informado el experto de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD), una institución promovida por la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), Federico Argüelles Arias.

No obstante, es difícil conocer la prevalencia real de la enfermedad debido a la inespecificidad de los síntomas y al hecho de que muchas personas afectadas autogestionan su intolerancia sin acudir al médico y realizando un manejo de la enfermedad que no siempre resulta adecuado.

"Aunque se considera que los pacientes pueden tolerar una cierta cantidad (unos 12 gramos) de lactosa al día, la casuística es tan variada y personal que, ante la sospecha de intolerancia, es necesario confirmar el diagnóstico a través de un especialista. Las pruebas son sencillas y no invasivas y nos permiten adecuar las medidas preventivas al paciente", ha señalado Argüelles Arias.

Y es que, la ingesta de lactosa no afecta a todas las personas del mismo modo. De hecho, algunas notan sus efectos de forma inmediata tras consumir pequeñas cantidades de lácteos, mientras otras tienen un umbral de sensibilidad más alto y es más difícil de observar su relación causa-efecto. También hay personas que pueden permanecer asintomáticas toda su vida porque no sobrepasan su umbral de sensibilidad con la cantidad de lactosa que consumen al día.

En este sentido, el especialista ha informado de que los síntomas que producen la intolerancia a la lactosa son hinchazón abdominal, diarrea, gases abdominales, flatulencia o meteorismo, dolor abdominal, retortijones, náuseas o vómitos. Unos síntomas que, a su juicio, pueden confundirse "fácilmente" con otras enfermedades digestivas como, por ejemplo, el síndrome de intestino irritable.

Ahora bien, la tasa y el ritmo de pérdida de lactosa varían según el origen étnico, por lo que la prevalencia de la intolerancia a lactosa difiere según las zonas geográficas. "Sabemos que los asiáticos pierden entre el 80 por ciento y el 90 por ciento de actividad de la lactosa. En cambio, en los europeos del norte la actividad de la lactosa se mantiene de forma más estable que en los europeos del sur y por tanto, no desarrollan intolerancia a lactosa con tanta frecuencia como en los países del sur de Europa", ha recalado.

Por último, Argüelles Arias ha destacado la necesidad de diferenciar entre personas hipolactásicas, es decir, malabsorbedores de lactosa, a las intolerantes a la lactosa, que son aquellos sujetos malabsorbedores de lactosa que presentan síntomas con el consumo de este azúcar.

LAS NOTICIAS MÁS LEÍDAS

1. Google renueva por completo la web de Google Play
1. Crecen de 1.000 a 200.000 al día los intentos de 'phishing' a usuarios de Apple
1. ¿Quién da más? Los venezolanos pujan por dólares para viajar
1. Huelga general en Grecia contra la reforma de la administración pública
1. La lucha vuelve con nuevos personajes y escenarios en Ultra Street Fighter IV



SECTORES

- Banca
- Construcción
- Energía
- Inmobiliario
- Medios de comunicación
- Motor
- Ocio y turismo
- Petróleo
- Telecomunicaciones
- Tecnología

FUENTES

- AFP
- Bolsamanía
- Consumer Reportajes
- EFE
- EFE Reportajes
- Europa Press
- Expansión.com
- Gigue.net
- Renta4
- Reuters
- Yahoo Finanzas

MATERIAS PRIMAS / ENERGÍA

- ▼ Divisas

RECOMENDADO POR NUESTROS EDITORES

Su navegador no está actualizado

Puede actualizar su navegador fácilmente desde la web de Microsoft: www.microsoft.com. ¿Por qué debería actualizarlo? - Ocultar



- CHANCE
- LATAM
- EPSOCIAL
- MOTOR
- TURISMO
- PORTALTIC
- SALUD
- .CAT

canalSALUD

STADA

ABONADOS Buscar...

europapress.es | SALUD

Miércoles, 17 de julio 2013

- POLÍTICA SANITARIA
- SALUD E INVESTIGACIÓN
- FARMACIA
- ASISTENCIA
- ESTETICA
- NUTRICIÓN
- MAYORES
- BLOGS

LOS SÍNTOMAS SON MUY INESPECÍFICOS

Hasta el 40% de los españoles puede sufrir intolerancia a la lactosa

Directorio

- Europa

Comentar

Enviar

Kindle

Tamaño: A A A

Compartir

- GOOGLE +
- FACEBOOK
- TWITTER
- MENÉAME
- TUENTI
- LINKEDIN



Foto: EUROPA PRESS

MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Hasta un 40 por ciento de los españoles puede sufrir intolerancia a la lactosa, según ha informado el experto de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD), una institución promovida por la Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD), Federico Argüelles Arias.

No obstante, es difícil conocer la prevalencia real de la enfermedad debido a la inespecificidad de los síntomas y al hecho de que muchas personas afectadas autogestionan su intolerancia sin acudir al médico y realizando un manejo de la enfermedad que no siempre resulta adecuado.

"Aunque se considera que los pacientes pueden tolerar una cierta cantidad (unos 12 gramos) de lactosa al día, la casuística es tan variada y personal que, ante la sospecha de intolerancia, es necesario confirmar el diagnóstico a través de un especialista. Las pruebas son sencillas y no invasivas y nos permiten adecuar las medidas preventivas al paciente", ha señalado Argüelles Arias.

Y es que, la ingesta de lactosa no afecta a todas las personas del mismo modo. De hecho, algunas notan sus efectos de forma inmediata tras consumir pequeñas cantidades de lácteos, mientras otras tienen un umbral de sensibilidad más alto y es más difícil de observar su relación causa-efecto. También hay personas que pueden permanecer asintomáticas toda su vida porque no sobrepasan su umbral de sensibilidad con la cantidad de lactosa que consumen al día.

En este sentido, el especialista ha informado de que los síntomas que producen la intolerancia a la lactosa son hinchazón abdominal, diarrea, gases abdominales, flatulencia o meteorismo, dolor abdominal, retortijones, náuseas o vómitos. Unos síntomas que, a su juicio, pueden confundirse "fácilmente" con otras enfermedades digestivas como, por ejemplo, el

canalSALUD

STADA

más salud, más vida

SAR QUAVITAE

Portal Fitness YouTube



CHANCE FAMOSOS Y MODA



KRISTEN STEWART YA HA ENCONTRADO SUSTITUTO A ROBERT PATINSON: EL ACTOR MICHAEL PITT

Relacionadas

Pacientes con cáncer de colon reclaman igualdad en el acceso a los tratamientos en toda Europa (Ayer a las 14:34)



coste asistencial del Parkinson en Europa asciende a casi 14.000 millones de euros al año