



**FEAD**  
FUNDACIÓN ESPAÑOLA  
DEL APARATO DIGESTIVO



---

## ENFERMEDAD DE CROHN

### DIAGNÓSTICO

Ante la sospecha de una enfermedad de Crohn, su médico le solicitará una analítica sanguínea, que permitirá valorar si existe anemia y si hay parámetros elevados que sugieran inflamación.

Entre las pruebas de imagen que se le pueden solicitar están:

- **Resonancia magnética intestinal:** Permite visualizar si existe inflamación activa, úlceras o zonas más estrechas que puedan provocar una obstrucción intestinal.
- **Colonoscopia con ileoscopia:** La exploración endoscópica del colon permite detectar si existen lesiones en la mucosa. Además, con esta técnica se puede alcanzar la parte final del intestino delgado (íleon) y valorar si existen úlceras a ese nivel. Mediante esta técnica, además, es posible tomar muestras que ayudarán en el diagnóstico.
- **Ecoendoscopia endoanal:** Consiste en la introducción de un tubo flexible por el ano. Este endoscopio es similar al de la colonoscopia, pero además de tener imagen directa (como una cámara en directo) permite realizar una ecografía que valora todas las capas de la pared anal. Esta técnica es de especial interés en aquellos pacientes que presentan fístulas anales.
- **Enteroscopia con cápsula:** Se trata de ingerir una microcámara del tamaño de una cápsula que toma imágenes a lo largo de todo el intestino delgado, de ese modo se puede ver si existen úlceras u otras lesiones en el intestino delgado.
- **Gammagrafía con leucocitos marcados:** Permite diferenciar tramos con lesiones antiguas y tramos con actividad inflamatoria aguda.

*Dra. Cristina Carretero Ribón*  
*Especialista de la Fundación Española de Aparato Digestivo*  
*Clínica Universitaria de Navarra*