DIAGNÓSTICO – Quistes hepáticos

Los **quistes hepáticos** son un grupo heterogéneo de lesiones, con diferente origen, frecuencia y síntomas. La mayoría son diagnosticados de forma accidental en estudios de imagen que se realizan por otro motivo y tienen un comportamiento benigno. Solo una minoría producen síntomas o complicaciones. Los de mayor tamaño tienen mayor probabilidad de producir síntomas o complicarse. Algunos tipos específicos de quistes, tienen complicaciones únicas como es la transformación maligna en el quiste mucinoso por el shock anafiláctico (reacción alérgica grave) en el quiste hidatídico.

El **diagnóstico** de los quistes hepáticos se realiza mediante técnicas de imagen que, además nos ayudan a diferenciarlos. La prueba diagnóstica inicial es la ecografía abdominal que también es muy útil en el seguimiento de las lesiones. Cuando existen dudas sobre el diagnóstico, pueden realizarse Tomografía Computarizada (TC) abdominal y/o Resonancia Magnética (RM). El uso de contraste intravenoso ayuda a diferenciar las lesiones ya que la captación de contraste es diferente en cada una de ellas. Además, el contraste puede evidenciar características del quiste que no son visibles en ausencia de contraste. La punción de los quistes no suele ser necesaria para el diagnóstico.

Dra. Susana Jiménez Contreras

Especialista de la Fundación Española de Aparato Digestivo

Hospital Vithas Xanit Internacional, Benalmádena (Málaga)