



FEAD
FUNDACIÓN ESPAÑOLA
DEL APARATO DIGESTIVO



SÍNTOMAS – Cáncer de Páncreas

Cuando el **cáncer de páncreas** está en un estadio inicial puede no producir síntomas; pero cuando los produce, los más frecuentes son cansancio, dolor abdominal y pérdida de peso, con o sin ictericia (coloración amarillenta de la piel y el blanco de los ojos):

- El **dolor** es un síntoma frecuente. Se presenta en la parte superior del abdomen como un dolor sordo que puede irradiarse en cinturón hacia la espalda. Puede ser intermitente y empeorar tras las comidas.
- La **pérdida de peso** puede ser secundaria a pérdida del apetito, la sensación de plenitud tras comer pequeñas cantidades de comida o presencia de diarrea. Las heces pueden parecer grasosas y flotar en el agua del inodoro (al contener grasa que no es digerida correctamente por la lesión del páncreas).
- La **ictericia** aparece cuando aumentan los niveles de bilirrubina en sangre. Las heces pueden carecer de su coloración marrón habitual y aparecer de coloración grisácea. La ictericia se produce por una interrupción del flujo de bilis desde la vesícula biliar (donde se almacena) al intestino, donde ayuda a la digestión de los alimentos. Este bloqueo suele ser producido por el tumor. El aumento de bilirrubina en sangre provoca que sea excretada en mayor cantidad con la orina, por lo que ésta adopta una coloración oscura como cognac.

Dra. Susana Jiménez Contreras

Especialista de la Fundación Española de Aparato Digestivo

Hospital Vithas Xanit Internacional, Benalmádena (Málaga)