

INFORMACIÓN Y POSICIONAMIENTO FEAD SOBRE LA VACUNACIÓN FRENTE A LA COVID -19



FEAD
FUNDACIÓN ESPAÑOLA
DEL APARATO DIGESTIVO

www.saludigestivo.es

POSICIONAMIENTO FEAD SOBRE LA VACUNACIÓN FRENTE A LA COVID -19

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) aprobó el 21 de diciembre de 2020 la vacuna de BioNTech-Pfizer frente al SARS-CoV-2, siguiendo la línea de lo hecho por vía de urgencia por otras agencias como la del Reino Unido y la de EE. UU. En la actualidad la EMA también ha aprobado la vacuna de Moderna. Ambas vacunas están basadas en un ARN mensajero encapsulado en partículas lipídicas que codifica para la proteína S de la cubierta del virus SARS-CoV-2. La vacuna BioNTech-Pfizer y la de Moderna proporcionan una protección superior al 90% contra la enfermedad COVID-19 con una buena tolerancia, aunque no exenta de efectos secundarios.

La Sociedad Española de Patología Digestiva (SEPD) ha creado un documento de posicionamiento con un conjunto de recomendaciones que faciliten a sus socios aconsejar a sus pacientes, especialmente a los pertenecientes a grupos de riesgo. En esa misma línea la Fundación Española de Aparato Digestivo (FEAD) se adhiere a ese posicionamiento y lo pone a disposición de toda la población conforme a su deber de información.

INFORMACIÓN SOBRE LA VACUNACIÓN FRENTE A LA COVID -19

¿Debo vacunarme de la COVID 19?

Aunque la vacunación es una decisión personal de modo genérico, y ante la evidencia científica disponible en el momento actual, la FEAD considera que la vacunación es **preferible a la no vacunación en todas las personas**, con o sin enfermedades digestivas.

¿Debo vacunarme si estoy tomando inmunosupresores, biológicos o moduladores de la actividad del sistema inmune?

Dado que NO existe ninguna evidencia en contra, **la FEAD recomienda la vacunación de los pacientes con enfermedades digestivas en tratamiento con fármacos inmunosupresores, biológicos o moduladores de la actividad del sistema inmune.** Esta recomendación debe individualizarse y, de acuerdo con el documento de posicionamiento de la Sociedad Española de Inmunología, es deseable que la vacunación se produzca en la remisión o menor actividad de la enfermedad. En cualquier caso, no recomendamos demorar la inmunización por el hecho de estar recibiendo los fármacos antedichos.

¿Debo vacunarme si estoy tomando antibióticos o antivirales?

Dado que no existe ninguna evidencia en contra, **la FEAD recomienda la vacunación en todos los pacientes con enfermedades digestivas en tratamiento o profilaxis con antibióticos y/o antivirales** sin necesidad de suspender y/o modificar la dosis de los mismos.

¿Debo vacunarme si tengo cáncer?

Los pacientes con cáncer como grupo tienen un mayor riesgo de enfermedad COVID-19 grave, que es mayor en el primer año del diagnóstico y después disminuye para alcanzar el riesgo basal a los cinco años del diagnóstico. A pesar de lo limitado de la información y en la misma línea que la ESMO, **la FEAD recomienda la vacunación de los pacientes con cáncer digestivo**, independientemente del tipo de cáncer y del tratamiento, dado que el tipo de vacuna aprobado no es previsible que cause problemas graves de seguridad.

¿Debo vacunarme si tengo cirrosis?

Los pacientes con cirrosis, especialmente aquellos con enfermedad descompensada (Child B y C), como grupo tienen también un mayor riesgo de enfermedad COVID-19 grave. Por ello, **la FEAD no solo recomienda la vacunación sino priorizarla en estos pacientes.**

¿Debo vacunarme si tengo enfermedad metabólica grasa?

Existen evidencias preliminares que sugieren que los pacientes con una enfermedad metabólica grasa y fibrosis avanzada, tienen un riesgo más alto que la población general de presentar una COVID-19 grave, por lo que **la FEAD recomienda la vacunación de estos pacientes, así como la priorización de los mismos**, especialmente si presentan comorbilidades del tipo HTA, DM u obesidad, como es la norma en los mismos.

¿Debo vacunarme si me han trasplantado algún órgano?

De acuerdo con la información disponible, el riesgo de COVID-19 grave es discretamente más alto en los trasplantados hepáticos en tratamiento con mofetil micofenolato, pero similar al de la población general en el resto de casos. Dado que no existe ninguna evidencia en contra, **la FEAD recomienda la vacunación en todos los pacientes sometidos a un trasplante hepático, especialmente de aquellos en tratamiento con mofetil micofenolato.**

¿Debo vacunarme si estoy embarazada?

No se dispone de la suficiente información para recomendar la vacunación a todas las mujeres embarazadas. En términos generales, se recomienda posponer hasta el final de la gestación. Valorar la vacunación de forma individualizada en casos concretos (alto riesgo de exposición / riesgo a sufrir complicaciones en caso de infección) siendo la decisión siempre voluntaria e informada.

¿Es segura la vacuna en personas que estén tomando Sintrom (o cualquier otro anticoagulante) o que tengan problemas de coagulación?

Este grupo de pacientes pueden vacunarse frente al SARS-CoV-2 ya que no supone una contraindicación. Consultar previamente por riesgo de hematomas / hemorragia en lugar de inyección.

¿Una vez vacunado debo continuar con las medidas de precaución?

Ninguna vacuna confiere una protección en el 100% de los pacientes por lo que, mientras no se haya producido una inmunización generalizada de la población, la FEAD recomienda el mantenimiento de las medidas universales de precaución frente al SARS-CoV-2.



FEAD
FUNDACIÓN ESPAÑOLA
DEL APARATO DIGESTIVO

www.saludigestivo.es