


Dado que NO existe evidencia científica en contra, estas son las recomendaciones de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) sobre la vacunación frente a la COVID -19 .




¿Debo vacunarme de la COVID 19?

Aunque la vacunación es una decisión personal de modo genérico, la FEAD considera que la vacunación es **preferible a la no vacunación en todas las personas**, con o sin enfermedades digestivas.



¿Debo vacunarme si estoy tomando inmunosupresores, biológicos o moduladores de la actividad del sistema inmune?

La FEAD recomienda la vacunación de los pacientes con enfermedades digestivas en tratamiento con fármacos inmunosupresores, biológicos o moduladores de la actividad del sistema inmune. Esta recomendación debe individualizarse y es deseable que la vacunación se produzca en la remisión o menor actividad de la enfermedad.




¿Debo vacunarme si estoy tomando antibióticos o antivirales?

La FEAD recomienda la vacunación en todos los pacientes con enfermedades digestivas en tratamiento o profilaxis con antibióticos y/o antivirales sin necesidad de suspender y/o modificar la dosis de los mismos.

¿Debo vacunarme si tengo cáncer?

Los pacientes con cáncer como grupo tienen un mayor riesgo de enfermedad COVID-19 grave, que es mayor en el primer año del diagnóstico. A pesar de lo limitado de la información y en la misma línea que la ESMO, **la FEAD recomienda la vacunación de los pacientes con cáncer digestivo**, independientemente del tipo de cáncer y del tratamiento.



¿Debo vacunarme si tengo cirrosis?

Los pacientes con cirrosis, especialmente aquellos con enfermedad descompensada (Child B y C), como grupo tienen también un mayor riesgo de enfermedad COVID-19 grave. Por ello, **la FEAD no solo recomienda la vacunación, sino priorizarla en estos pacientes.**

¿Debo vacunarme si tengo enfermedad metabólica grasa?

Existen evidencias preliminares que sugieren que los pacientes con una enfermedad metabólica grasa y fibrosis avanzada, tienen un riesgo más alto que la población general de presentar una COVID-19 grave, por lo que **la FEAD recomienda la vacunación de estos pacientes, así como la priorización de los mismos**, especialmente si presentan comorbilidades del tipo HTA, DM u obesidad.



¿Debo vacunarme si estoy embarazada?

No se dispone de la suficiente información para recomendar la vacunación a todas las mujeres embarazadas. En términos generales, se recomienda posponer hasta el final de la gestación. Valorar la vacunación de forma individualizada en casos concretos (alto riesgo de exposición / riesgo a sufrir complicaciones en caso de infección) siendo la decisión siempre voluntaria e informada.

¿Es segura la vacuna en personas que estén tomando Sintrom (o cualquier otro anticoagulante) o que tengan problemas de coagulación?

Este grupo de pacientes pueden vacunarse frente al SARS-CoV-2 ya que no supone una contraindicación. Consultar previamente por riesgo de hematomas / hemorragia en lugar de inyección.

¿Debo vacunarme si me han transplantado algún órgano?

El riesgo de COVID-19 grave es discretamente más alto en los trasplantados hepáticos en tratamiento con mofetil micofenolato, pero similar al de la población general en el resto de casos. **La FEAD recomienda la vacunación en todos los pacientes sometidos a un trasplante hepático, especialmente de aquellos en tratamiento con mofetil micofenolato.**



¿Una vez vacunado debo continuar con las medidas de precaución?

Ninguna vacuna confiere una protección en el 100% de los pacientes por lo que, mientras no se haya producido una inmunización generalizada de la población, la FEAD recomienda el mantenimiento de las medidas universales de precaución frente al SARS-CoV-2.